

Instruccion para Colonoscopia

Agenda transportacion, usted NO debe de manejar a casa despues de el procedimiento.

Si tiene preguntas sobre sus medicamentos si debe tomarlos o no porfavor dejenos saber. Estamos para ayudarle!

Discontinue los siguientes medicamentos de 3-5 dias antes:

- Aspirina, ibuprofen, suplementos de hierro, medicamentos para bajar de peso incluyendo medicamentos genericos, metformin (Glucophage), Coumadin (Warfin), Pesantine (Dipyridamole), Plavix, Ticlid u otros adelgasantes de sangre.

Medicamentos que puede continuar:

- Medicamentos para el Corazon, para la presion, pulmones y para convulsiones (tomar estos medicamentos con un sorbo de agua en la manana temprano el dia de su procedimiento)
- Insulin: ½ dosis de su insulin regular: si utilize pompa de insulin porfavor dejenos saber para diferentes instrucciones.

2 Dias de Preparacion:

1er Dia: Dieta liquida

- En este dia: usted debe de comenzar su dieta liquida **(TODO EL DIA)** la cual incluye lo siguiente:
 - Jugos claros sin pulpa, gelatin clara, hielo, agua, te dulce, café sin leche o crema, paletas de hielo (unicamente colores claros o amarillo), caldos claros, bebidas carbonatadas, incluyendo avena.
- Comprar (No requiere receta) el Citrato de Magnesio, el cual puede mezclar con jugo de manzana. Tomar el Citrato de Magnesio a las 5:00 pm.

2do Dia: Dieta de liquidos Claros:

- En este dia: usted debe comenzar su dieta liquida clara **(TODO EL DIA)** la cual incluye:
 - Gelatin (unicamente colores claros o amarilla), sopas, caldos claros (pollo o carne), jugos claros (manzana, Durazno o uva blanca), te claro, café(sin leche o crema), 7-up y agua.
- Se le entregara una receta para Clenpiq para que la lleve a su farmacia.
- Las instrucciones para este medicamento se encuentran en la segunda pagina.

En caso de que su aseguranza no cubra Clenpiq usted tendra que tomar Golytely, las instrucciones seran las siguientes:

- **Golytely** es un gallon el cual tendra que comenzar a beber a las 12:00 pm el Segundo dia de su preparacion, beber 8oz cada 10-15 minutos hasta terminar el gallon, este debera de terminarlo en las siguientes 3 horas.

Dejar de consumer liquidos 8 horas antes de su procedimiento.



CLENPIQ™

(sodium picosulfate, magnesium oxide,
and anhydrous citric acid) Oral Solution

10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

Starts with the Prep

Hoja de Instrucciones



Dia antes del procedimiento

Tarde antes del dia del procedimiento

Entre 1:00pm – 4:00pm

1-Beber una botella de CLENPIQ

Seguido de 6 vasos (8oz) de agua




Entre 6:00pm – 8:00pm

2-Beber segunda botella de CLENPIQ

Seguido de 6 vasos (8oz)de agua

Continuar hidratacion



6 vasos de 8oz